

Seminarium 2

SF1661

Lars Filipsson

Institutionen för matematik
KTH

Allmänna tips:

- Förenkla det innersta först
- Avstå från att multiplicera ihop
- Avstå från att utveckla kvadrater
- Behåll faktoriseringar, bryt ut faktorer snarare än gånga in

Uppgift 1

Några nedslag:

- $\left(\frac{1/25}{2/75}\right)^2 = \left(\frac{\frac{1}{25}}{\frac{2}{75}}\right)^2 = \left(\frac{25}{25 \cdot 2}\right)^2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2$

- $(4^5)^{1/2} = 4^{5 \cdot \frac{1}{2}} = (4^{1/2})^5 = 2^5 = 32$

- $\underline{a^2b + ab^2} = \underline{ab(a+b)}$

Uppgift 2 a

Konstruera ett polynom p sådant att

$p(-1) = p(1) = p(-2) = p(2) = p(0) = 0$ och $p(x) \neq 0$ för alla andra $x \in \mathbb{R}$. Finns det flera olika sådana polynom? Om så är fallet, kan du lägga till ytterligare ett eller flera villkor så att lösningen blir entydig? INLÄMNAD LÖSNING:

$$x^2 - 1 = 3$$

$$x=7 \Rightarrow x \leq 7$$

$$?/4$$

ref. t. f-satsen.

~~$$p(x) = 0 \quad x \in \mathbb{R} \quad -2 \leq x \leq 2$$~~

$$(x+1)(x-1)(x+2)(x-2)x = 0$$

$$\Leftrightarrow (x^2-1)(x^2-4)x = 0$$

$$\text{Ekv.} \Rightarrow x^5 - 5x^3 - 4x = 0$$

Vad är p ?

Finns fler. Lägga till villkoret att det ska vara femte gradens. Otillräckligt.

Desutom: koeff. framför x^5 ska vara 1.

$$p(x) = x^5 - 5x^3 - 4x$$

Uppgift 2a

Vårt gemensamma förslag på lösning (som jag ser ut).

Faktorsatsen säger att för alla polynom p gäller:

$$p(a) = 0 \Leftrightarrow p(x) = (x-a)q(x) \text{ f. något polynom } q.$$

Det betyder att $p(x) = (x-1)(x+1)(x-2)(x+2)x$ har de egenskaper som efterfrågas. Det har de efterfrågade nollställena ± 1 , ± 2 och 0 och kan inte ha fler nollställen för enligt Faktorsatsen skulle polynomet, om det hade något annat nollställe a , också ha en faktor $(x-a)$.

Forts. nedan:

Forts: Finns det fler polynom med dessa egenskaper? Ja, vi kan multiplicera vårt $p(x)$ med vilket polynom som helst som inte har andra reella nollställen än $\pm 1, \pm 2$ och 0 .

Så enligt faktorsatsen är alla polynom som uppfyller villkoren på formen

$$q(x) = p(x) \cdot (x-1)^{a_1} \cdot (x+1)^{a_2} \cdot (x-2)^{a_3} \cdot (x+2)^{a_4} \cdot x^{a_5} \cdot s(x)$$

där $a_1, \dots, a_5$ är icke-negativa heltal och $s(x)$ ett polynom utan reella nollställen och $p(x)$ som ovan..

Faktorsatsen impliceras att varje polynom som uppfyller villkoren har grad minst 5 så om vi lägger till kravet att polynomet ska ha grad 5 och dessutom ha koefficienten 1 framför x^5 så blir lösningen entydig.

Uppgift 2a

Uppgift 2 b

Ange ett fjärdegradspolynom q som har precis två reella nollställen. INLÄMNAD LÖSNING:

$$q(x) = (x-1)^2(x-2)^2$$

Two dubbelrötter 1 och 2.

Vår lösning: Enligt faktorsatsen så måste ett polynom som har de reella nollställena a och b ha faktorerna $(x-a)$ och $(x-b)$. Om vi multiplicerar produkten av dessa med ett andragradspolynom $s(x)$ utan reella nollställen får vi ett polynom q med de rätta egenskaperna. Tex kan vi ta $q(x) = (x-1)(x-2)(x^2+1)$.

Uppgift 2b

Uppgift 2b

Uppgift 2b

Uppgift 3

Lös ekvationen $\sqrt[3]{x^2 + 4x - 4} = x$

$$a^3 = b \Leftrightarrow a = \sqrt[3]{b}$$

INLÄMNAD

LÖSNING:

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{x^2 + 4x - 4} &= x \\ \Rightarrow x^2 + 4x - 4 &= x^3 \\ \Rightarrow x^3 - x^2 - 4x + 4 &= 0 \end{aligned}$$

$\Leftrightarrow ?$
 $\Rightarrow ?$

vi löser $x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow x = 2$.

Kontrollera lösningarna:

$$\sqrt[3]{1+4-4} = 1 \quad \text{ok}$$

$$\sqrt[3]{4+8-4} = 2 \quad \text{ok}$$

$$\sqrt[3]{4-8-4} = -2 \quad \text{falsk rot}$$

Svar: 1, 2 Fel svar.

Behövt för nästa svar.

Förklara!

Ser att $x=1$ är en lösning.

$$\begin{array}{r} x^2 - 4 \\ x-1 \overline{) x^3 - x^2 - 4x + 4} \\ \underline{-(x^3 - x^2)} \\ -4x + 4 \\ \underline{-(-4x + 4)} \\ 0 \end{array}$$

$$\Rightarrow (x-1)(x-2)(x+2) = 0 \Rightarrow x = 1 \text{ el. } x = 2, \text{ el. } x = -2$$

Uppgift 3

$$\sqrt[3]{x^2 + 4x - 4} = x$$

$$\Leftrightarrow \dots$$

$$\Leftrightarrow x^3 - x^2 - 4x + 4 = 0$$

Se att $x=1$ löser.

Så $(x-1)$ är en faktor.

Polynomdiv. ger

$$x^3 - x^2 - 4x + 4 = 0 \Leftrightarrow (x-1)(x-2)(x+2) = 0$$

$$\Leftrightarrow x=1 \text{ el. } x=2 \text{ el. } x=-2.$$

Uppgift 3

Var lösning 1

Det gäller att $\sqrt[3]{x^2+4x-4} = x \Leftrightarrow x^3+x^2-4x+4 = x^3$
 $\Leftrightarrow x^3-x^2-4x+4 = 0$. Vi ser att $x=1$ är
en lösning till denna ekvation. Enligt faktorsatsen
är då $x-1$ en faktor i vänster led. Med
polynomdivision ser vi att $x^3-x^2-4x+4 = (x-1)(x^2-4)$
 $= (x-1)(x-2)(x+2)$

Därför gäller att

$$\sqrt[3]{x^2+4x-4} = x \Leftrightarrow x^3-x^2-4x+4 = 0 \Leftrightarrow (x-1)(x-2)(x+2) = 0$$

$\Leftrightarrow x=1$ el. $x=2$ el. $x=-2$. Svar: Lösningarna är
 $x=1, x=2, x=-2$.

Uppgift 3

Vår lösning 2

Vi har att $\sqrt[3]{x^2+4x-4} = x \Rightarrow x^2+4x-4 = x^3$

$\Rightarrow x^3 - x^2 - 4x + 4 = 0$. Vi ser att $x=1$ är en lösning till den sista ekvationen. Som i vår lösning 1 ser vi att $x=2$ och $x=-2$ är de övriga lösningarna till den sista ekvationen. Vi måste nu kontrollera om dessa tre lösningar också är lösningar till den ursprungliga ekvationen.

Insättning ger: $\sqrt[3]{1^2+4\cdot 1-4} = 1$ stämmer,

$\sqrt[3]{2^2+4\cdot 2-4} = 2$ stämmer, $\sqrt[3]{(-2)^2+4\cdot (-2)-4} = -2$ stämmer.

Svar: Lösningarna är $x=1, x=2$ och $x=-2$

Uppgift 4

Lös olikheten $x^2 + 1 \geq \frac{1}{x+1}$

INLÄMNAD LÖSNING:

$$x^2 + 1 \geq \frac{1}{x+1}$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 1 - \frac{1}{x+1} \geq 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^3 + x^2 + x}{x+1} \geq 0$$

Förklar: gör tri
fakt...

$$\text{Alt: } + \left(\left(x + \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{4} \right)$$

$$\Leftrightarrow \frac{x(x^2 + x + 1)}{x+1} \geq 0$$

+ tecken
testa...

$$\left. \begin{array}{l} x^3 + x^2 + x \geq 0 \\ x+1 \geq 0 \end{array} \right\}$$

Förklar

$$\dots x \geq 0$$

$\parallel \mathbb{R}$

$$\left. \begin{array}{l} x^3 + x^2 + x \leq 0 \\ x+1 < 0 \end{array} \right\}$$

Förklar

$$\dots x < -1$$

$\parallel \mathbb{R}$

x f -1 sti.

Svar:

Uppgift 4

Vår lösning 1: vi ser att $x \neq -1$. Det gäller att

$$x^2 + 1 \geq \frac{1}{x+1} \Leftrightarrow x^2 + 1 - \frac{1}{x+1} \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$\frac{(x^2 + 1)(x + 1) - 1}{x + 1} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{x^3 + x^2 + x}{x + 1} \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$\frac{x(x^2 + x + 1)}{x + 1} \geq 0. \text{ Vi ser att } x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0.$$

TECKENSTUDIUM:

X		-1		0	
X	-	-	-	0	+
x+1	-	X	+	+	+
x ² +x+1	+	+	+	+	+
$\frac{x(x^2+x+1)}{x+1}$	+	X	-	0	+

Av teckenstudiet följer att olikheten är uppfylld då $x < -1$ och då $x \geq 0$.

Svar: $x < -1$ eller $x \geq 0$.

ANNAN INLÄMNAD LÖSNING

$$x^2 + 1 \geq \frac{1}{x+1} \quad (*)$$

Fall 1 $x+1 > 0$

$$(*) \Leftrightarrow (x+1)(x^2+1) \geq 1$$

$$\Leftrightarrow x^3 + x^2 + x + 1 \geq 1$$

$$\Leftrightarrow x^3 + x^2 + x \geq 0$$

$$\Leftrightarrow x \overbrace{(x^2 + x + 1)}^{> 0} \geq 0$$

~~$$x = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} - 1} = \frac{1}{2}$$~~

$$\Leftrightarrow \text{Så här: } x \geq 0$$

Fall 2 $x+1 < 0$

$$* \Leftrightarrow (x+1)(x^2+1) \leq 1$$

⋮

$$x < -1$$

Uppgift 4

2a lösning 2. Vi ser att $x \neq -1$. Vi delar in lösningen i två olika fall. Fall 1 är då $x > -1$ och fall 2 är då $x < -1$.

Fall 1. När $x > -1$ gäller att $x^2 + 1 \geq \frac{1}{x+1} \Leftrightarrow$

$$(x+1)(x^2+1) \geq 1 \Leftrightarrow x^3 + x^2 + x + 1 \geq 1 \Leftrightarrow$$

$$x^3 + x^2 + x \geq 0 \Leftrightarrow x(x^2 + x + 1) \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$x\left(\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\right) \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 0. \text{ Olikheten är alltid uppfyllt för alla } x \geq 0.$$

Fall 2. När $x < -1$ gäller att $x^2 + 1 \geq \frac{1}{x+1} \Leftrightarrow$

$$(x+1)(x^2+1) \leq 1 \Leftrightarrow x^3 + x^2 + x + 1 \leq 1 \Leftrightarrow$$

$$x(x^2 + x + 1) \leq 0 \Leftrightarrow x\left(\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\right) \leq 0 \Leftrightarrow x \leq 0.$$

Eftersom ekvivalensen här bara gäller då $x < -1$ får vi i fall 2 att olikheten är uppfyllt för alla $x < -1$. Svar...

Uppgift 5

Finns det nåt rationellt tal r sådant att $r^3 = 3$? Bevisa ditt påstående. ~~INLÄMNAD LÖSNING~~ //

Antagande: a^3 delbart med 3 $\Rightarrow a$ delbart med 3 //

$a^3 = 3 \cdot b^3 \Rightarrow$ innebär att båda led är delbara med 3

b^3 delbart med 3 $\Rightarrow b$ delbart med 3

a och b har en gemensam faktor

$\Rightarrow r^3 \neq 3.$

Uppgift 5

Antag att r är rationellt och $r^2 = 3$.

Då $r = \frac{p}{q}$ förkortat så löst möjligt.

$\vdots$

$\frac{p}{q}$ inte är förkortat så löst möjligt

Motsträde.

Således: Antagandet var fel.

Uppgift 5

Vår lösning. Det finns inget rationellt tal r sådant att $r^3 = 3$.

Bevis: Antag att det finns ett rationellt tal r sådant att $r^3 = 3$. Då kan r skrivas $r = \frac{p}{q}$, för heltal p och q , förkortat så långt som möjligt. Vi har då att $\left(\frac{p}{q}\right)^3 = 3 \Rightarrow p^3 = 3q^3 \Rightarrow 3 \mid p^3 \Rightarrow 3 \mid p$. (ty 3 primtal)

Så $p = 3s$ för något heltal s . Det ger att

$$\frac{p}{q} = \frac{3s}{q} \text{ och } \left(\frac{p}{q}\right)^3 = 3 \Rightarrow \left(\frac{3s}{q}\right)^3 = 3 \Rightarrow 3^3 s^3 = 3q^3 \\ \Rightarrow 3 \mid q^3 \Rightarrow 3 \mid q, \text{ (ty 3 primtal).}$$

Uppgift 5

Vi får alltså att både p och q är delbara med 3 vilket motsäger att $\frac{p}{q}$ var förkortat så långt möjligt.

Antagandet att det finns ett rationellt tal r s.a. $r^3 = 3$ leder alltså till en motsägelse. Därför kan inte antagandet vara sant.

Det finns alltså inget rationellt tal r s.a. $r^3 = 3$.

Uppgift 5

Uppgift 6

Elev: "Eftersom både $2 \cdot 2 = 4$ och $(-2) \cdot (-2) = 4$ så måste $\sqrt{4} = \pm 2$ ". Rätt eller fel? Vad svarar du eleven?

$x^2 = 4$ har två lösningar
men bara en av dessa är $\sqrt{4}$.

Det ^{$x \geq 0$} $\sqrt{x}$ är det icke-neg. tal
vars kvadrat är x .
 $-\sqrt{4}$

Uppgift 6

$x^2 = 4$ har två lösningar
men bara en av dessa är $\sqrt{4}$,
nämligen den positiva.

Det är ett val vi har gjort i
definitionen av kvadratroten.

Def: För icke-negativa reella tal x
definieras $\sqrt{x}$ som det icke-negativa
tal vars kvadrat är x .

Uppgift 6

